

Vaccinatieschade symptomen.

Acute symptomen zijn o.a.

- Bronchitis
- Diarree
- Flauw vallen
- Gezwollen ledematen rondom entingplaats
- Hersenontsteking
- Hersenvliesontsteking
- Huilen veel en ontroostbaar, doordringend, hartverscheurend
- Kinkhoest achtige hoest
- Koorts
- Korte wegraking
- Krijsend huilen
- Longontsteking
- Overmatig slapen
- Shock
- Stuipen

Chronische post-vaccinaal syndroom symptomen.

- Allergieën
- Astma
- Bronchitis
- Concentratiestoornissen
- Coördinatiestoornissen
- Diarree
- Eczeem
- Emotionele onevenwichtigheid
- Futloosheid
- Gedragsstoornissen met onrust agressiviteit
- Geel of groen snot
- Geestelijk achterblijven
- Geheugenverlies
- Geïrriteerdheid
- Gewrichtsontsteking

- Groeistoornissen
- Hardlijvigheid
- Hoesten
- Hoofdpijn
- Inprentingstoornis
- Middenoorontsteking
- Ontwikkelingsstoornissen
- Overmatig dorst
- Rochelende ademhaling
- Scheelzien
- Slaapstoornissen
- Stemningsveranderingen
- Suikerziekte
- verkoudheden
- Verlies van oog contact
- Verlies van wilskracht
- Vermoeidheid
- Verwardheid

Het moge duidelijk zijn dat deze lijst onvolledig is, reden hiervoor is dat post- vaccinale ziektesymptomen zeer uit een lopend van aard kunnen zijn. Het symptoom op zich is meestal niet de belangrijkste aanwijzing voor de diagnose, maar cruciaal is het moment van optreden. Ook moge duidelijk zijn dat bepaalde symptomen niet toe te schrijven zijn aan één vaccinatie. Ook is er geen duidelijke lijn te trekken betreffende acute dan wel chronische klachten.

Dat iemand geen directe ofwel acute reactie op een vaccinatie heeft gehad, betekent nog niet dat het vaccin niet de oorzaak zou kunnen zijn van chronische klachten. Vaak wordt duidelijk dat er sprake is van een bepaalde vorm van stapeling.

Preventie

Op de vraag kunnen we ook preventie iets doen hier het volgende. We kunnen op energetische niveau enige bescherming aanbrengen zodat het vaccin niet langer is staat is die te verstoren. Het organisme is dan als het ware voor de naderende 'Kunstmatige "ziekte gewaarschuwd en kan zo er voor zorgen dat het evenwicht beter gehandhaafd wordt.

Werkwijze : twee dagen voor de vaccinatie geven we het gepotentiëerde vaccin (bijv. BMR) in een 200K, ongeveer 2 korrels , en herhalen dat nog eens na de vaccinatie (dezelfde dag nog). Raadzaam is ook het spuitje te vragen, hiermee kunnen we het lichaam ook ontstoren. Krijgt het kind voorlopig geen vaccins meer dan is het verstandig het gepotentiëerde vaccin te geven in een oplopende potentie van 30 K, 200K MK, XMK in vier opvolgende dagen. Di t doet men om op dieper energetische niveau de verstoring te corrigeren.

Praktijk De Wenteltrap voor bewustwording.

Wil je een consult aanvragen ? [Vul dan hier je gegevens in.](#)